

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/bayer-advantix-krople-na-kleszcze-i-pchly-4x2-5ml-p-151834.html>



Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x2,5ml

Cena	105,90 zł
Numer katalogowy	5909997024219
Kod producenta	5909997024219
Specjalna potrzeba	Alergia skórna
Zastosowanie	Owadobójcze
Specjalna potrzeba(filtry)	Skóra
Faza życia	Wszystkie fazy życia
Pojemność	10
Wielkość pupila	Rasy średnie, Rasy duże

Opis produktu

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x2,5ml - Opis Produktu

Bayer Advantix to preparat ochronny w kroplach dla psów powyżej 7 tygodnia życia i ras od 10 do 25kg, eliminujący kleszcze, pchły, wszy, wszolę.

Jednorazowe zastosowanie zapobiega dalszej infestacji kleszczy i pcheł przez cztery tygodnie, przez co ogranicza się ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Ponowna infestacja związana z pojawieniem się w otoczeniu zwierzęcia nowych pcheł może trwać przez sześć tygodni lub dłużej po rozpoczęciu leczenia.

Może być stosowany jako element terapii alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS).

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x2,5ml - Dane Techniczne

- Pojemność: 4x2,5ml
- Skład: imidaklopid - 40mg, permetryna - 200mg

Bayer Advantix Krople Na Kleszcze I Pchły 4x2,5ml - Sposób Użycia

- Wymij pipetę z opakowania
- Trzymając pipetę w pozycji pionowej, końcówką do góry, przekręć i zdejmij końcówkę
- Odwróć końcówkę i umieść drugim końcem na pipiecie. Przekręć końcówkę, aby przebić zamknięcie, po czym zdejmij końcówkę z pipety
- Zawartość pipety należy zakropić na skórę psa od łopatek do nasady ogona
- Zalecana minimalna dawka wynosi 10 mg/kg masy ciała imidaklopidu i 50 mg/kg masy ciała permetryny
- Wyłącznie do stosowania na skórę

Dodatkowe Informacje

Aby utrudnić pchłom bytowanie w środowisku, zaleca się stosowanie środków zwalczających dorosłe pchły i osobniki w stadiach rozwojowych w otoczeniu zwierzęcia.

Jednorazowe leczenie zapewnia widoczne działanie odstraszające wobec meszek i komarów w ciągu czterech tygodni, zmniejszając przez to ryzyko wystąpienia chorób przez nie przenoszonych.

Preparat zachowuje skuteczność po zmoczeniu sierści zwierzęcia.

Jednakże w przypadku częstego kontaktu z wodą, konieczne może być ponowne naniesienie preparatu, w zależności od obecności ektopasożytów w otoczeniu zwierzęcia.

W takim przypadku nie należy stosować preparatu częściej, niż raz na tydzień.

W przypadku zaistnienia konieczności umycia psa szamponem, zaleca się uczynić to przed naniesieniem preparatu lub przynajmniej w tydzień po jego zastosowaniu, w celu uniknięcia konieczności powtarzania zabiegu.

Działania niepożądane:

W rzadkich przypadkach może wystąpić u psów przejściowa nadwrażliwość skóry (łącznie z objawami świądu i rumieniem w miejscu podania) i osowiałość.

Ostrzeżenia specjalne:

Należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do kontaktu zawartości pipety z oczami lub pyskiem psa, u którego stosuje się preparat. Należy dopilnować, aby produkt został podany we właściwy sposób, zgodnie z opisem w części (dawkowanie).