

Link do produktu: <https://www.sklepdlazwierzat.net/vetos-farma-pyrantel-35-g-pasta-odrobaczajaca-doustna-dla-koni-p-154943.html>

Vetos-Farma Pyrantel 35 g pasta odrobaczająca doustna dla koni



Cena	36,84 zł
Numer katalogowy	5909997001401
Kod producenta	5909997001401

Opis produktu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, produkt jest dostępny do sprzedaży tylko w przypadku odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej. Produkty znajdujące się na liście OTC nie mogą być sprzedawane przez sklep do gabinetów weterynaryjnych oraz sklepów zoologicznych. Nie wystawiamy faktury VAT !!!

Zawartość substancji czynnej (-ch) i innych substancji:

Embonian pyrantelu 35 g/100 g

Wskazania lecznicze:

Robaczycy jelitowe u koni wywołane przez wrażliwe na działanie leku formy dojrzałe i rozwojowe pasożytów obłych w obrębie przewodu pokarmowego, takich jak: *Parascaris equorum*, *Strongylus vulgaris*, *Strongylus equinus*, *Probstmayria vivipara*, *Strongylus endentatus*, *Oxyuris equi*. W podwojonej dawce działa również na tasiemca jelitowego *Anoplocephala perfoliata*.

Przeciwwskazania:

Brak.

Działania niepożądane:

U źrebiąt w 30 minut po zastosowaniu leku mogą wystąpić lekkie kolki. W następstwie silnej inwazji glistą końską (*Parascaris equorum*) może dojść do zatkania światła jelit cienkich martwymi pasożytami po podaniu leku. Działania niepożądane nasilają środki fosforoorganiczne i dietylokarbaminiany, stosowane często jako środki biobójcze przeciwko ektopasożytom. O wystąpieniu działań niepożądanych po podaniu tego produktu lub zaobserwowaniu jakichkolwiek niepokojących objawów nie wymienionych w ulotce (w tym również objawów u człowieka na skutek kontaktu z lekiem), należy powiadomić właściwego lekarza weterynarii, podmiot odpowiedzialny lub Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Formularz zgłoszeniowy należy pobrać ze strony internetowej <http://www.urpl.gov.pl> (Pion Produktów Leczniczych Weterynaryjnych).

Docelowe gatunki zwierząt:

Koń.

Dawkowanie dla każdego gatunku, droga (-i) i sposób podania:

W przeliczeniu na embonian pyrantelu jednorazowo przeciw nicieniom podawać 19 mg/kg mc., w przypadku inwazji tasiemca *Anoplocephala perfoliata* podać dwukrotnie większą dawkę – 38 mg/kg mc. Produkt podawać doustnie, na nasadę języka. Tubostrzykawkę wprowadzić w okolice kąta pyska, kierując jej końcówkę ku tyłowi i podać odmierzoną część pasty. Odchylenie głowy konia do góry sprzyja połknięciu pasty. Pełna zawartość tubostrzykawki wystarcza do odrobaczenia konia o masie 550 kg.

Zalecenia dla prawidłowego podania:

Brak.

Okres karencji:

Nie stosować u koni, których tkanki są przeznaczone do spożycia przez ludzi.

Szczególne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym

dla dzieci. Nie używać po upływie terminu ważności podanego na etykiecie.